



あなたは新型コロナウイルスのワクチン接種しましたか

接種の効果は 2回目終了の1～2週間後に免疫がつく、95%の人が発症を防げる

ファイザー製



モデルナ製



主な副反応は 2回目は副反応が強く出やすいので注意

| | ファイザー | | モデルナ | |
|----------|---------|---------|---------|---------|
| | 1回目 (%) | 2回目 (%) | 1回目 (%) | 2回目 (%) |
| 接種部位の痛み | 77.8 | 72.6 | 83.7 | 88.2 |
| 頭痛 | 34.5 | 46.1 | 32.7 | 58.6 |
| 疲労 | 41.5 | 55.5 | 37.2 | 65.3 |
| 筋肉痛 | 18.0 | 33.5 | 22.7 | 58.0 |
| 関節痛 | 9.9 | 20.5 | 16.6 | 42.8 |
| 悪寒 | 10.6 | 29.6 | 8.3 | 44.2 |
| 発熱 38度以上 | 2.7 | 13.6 | 0.8 | 15.5 |

接種後の注意は・・・

- ・ 副反応の起こりやすいのは接種日・・・1週間以内、当日と2日目に多い
- ・ 当日の飲酒、激しい運動は避ける・入浴はOK
- ・ 痛み止めや解熱剤の服用は可
- ・ 急な体調の変化はすぐ医師に相談。接種したことを告げる
- ・ 2回目の接種、予約は忘れずに